

Preglednica: okvirne količine gnojila in čas trošenja po posameznih rastlinskih vrstah

KULTURA	KOLIČINA v g/m ² (× 10=kg/ha)	ČAS UPORABE
VRTNINE		
Grah	20 - 30	1 - 2 tedna pred saditvijo ali dognojevanje, ko so rastline 10 cm visoke
Visoki fižol	20 - 30	1 - 2 tedna pred setvijo ali po setvi do tik pred vzpenjanjem
Nizki fižol	20 - 40	1 - 2 tedna pred setvijo
Solata	30 - 40	Spomladi 2 - 3 tedne pred sajenjem; poleti je dovolj 6 - 8 dni pred sajenjem.
Korenje	30 - 40	2 - 3 tedne pred setvijo
Špinača	30 - 50	2 - 3 tedne pred setvijo
Kumare	30 - 50	2 - 3 tedne pred sajenjem ali sejanjem
Por	30 - 50 30 - 50	Pred setvijo oz. sajenjem ali po sajenju, ko so rastline 10 cm visoke.
Paradižnik	40 - 50	3 tedne pred sajenjem
Paprika	50 - 50	3 tedne pred sajenjem
Zelena	30 - 50	3 tedne pred sajenjem
Kapusnice	30 - 50 30 - 40	3 tedne pred sajenjem 2 - 3 tedne po sajenju
Beluši	40 - 50	Takoj, ko plevel zraste in tako dolgo dokler lahko beluš prevoziš.
Čebula, čebulček	30 - 50 30 - 50	2 - 3 tedne pred setvijo oz. sajenjem ali 2 - 3 tedne po sajenju, ko so rastline 10 cm visoke
Krompir	40 - 50	Zgodaj spomladi do tik pred poganjanjem.
SADJE, TRTA, OKRASNE RASTLINE, PAŠNIKI, TRAVNIKI in TRATE		
Pečkato in koščičasto sadno drevje	25 - 35	Glede na N-potrebo do začetka brstenja.
Jagode	20 - 50	Spomladi 20-30 g/m ² na suh sestoj, oz. 50 g/m ² po obiranju.
Jagodičevje, okrasno drevje in grmičevje	30 - 50	Glede na N-potrebo do začetka brstenja.
Trta	10 - 50	Zgodaj spomladi, najpozneje 10 - 14 dni pred brstenjem.
Travniki, pašniki in okrasna trata	40 - 45 in 30 - 40	Spomladi ob začetku vegetacije in junija ali julija, živali se spustijo na pašo 10 - 14 dni po gnojenju.
POLJŠČINE		
Ozimna pšenica, Ozimna rž Oz. ječmen	25 - 40 30 - 40 30 - 40	Manjše količine pred setvijo ali jeseni pri treh listih žita. Večje količine spomladi na razviti sestoj (stadij 21 - 30).
Oz. ogrščica	30 - 50	Manjše količine jeseni. Večje spomladi pred začetkom vegetacije.
Sončnice	25 - 30	Pri 15-30 cm rastne višine sončnic.
Jara pšenica, jara rž, ječmen, oves	20 - 30 25 - 30	Pred setvijo ali vznikom do konca razraščanja.
Pivovarniški ječmen	20 - 30	Pred setvijo.
Koruza	30 - 50	Večje količine pred setvijo. Med setvijo in vznikom 30-50 g/m ² .
Sladkor. in krmna pesa	30 - 50	Ob koncu zime zaorati ali spomladi pravočasno pred setvijo.
Strniščna repa	25 - 40	Vnesti - zajezitev golšavosti.
KOMPOSTIRANJE		
na vsako 25 cm debelo plast organskih ostankov enakomerno potrosimo 50 g/m ² gnojila		

Zelo pomembno je, da upoštevamo čakalno dobo (2 do 3 dni na 10 g potrošenega gnojila na m²) in če dognojujemo, da to opravimo, ko so listi suhi in rastline ukoreninjene!